

Tabla 2_estudio seleccionado el 14/04/2020

Autoras: Isabel María Martínez Férrez y Ana María Carlos Gil

Fecha	Puntuación <i>Altmetric</i>	Revista	Título	Autor / País <i>Link</i>	Objetivo	Descripción
14/04/2020	269 (343 twitters)	Am J Obstet Gynecol	Care of the Pregnant Woman with COVID-19 in Labor and Delivery: Anesthesia, Emergency cesarean delivery, Differential diagnosis in the acutely ill parturient, Care of the newborn, and Protection of the healthcare personnel	Ashokka, B. <i>et al.</i> / Singapur y Chile http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2020.04.005	Proporcionar estrategias de manejo de mujeres embarazadas con COVID-19.	El número de casos de COVID-19 continúa aumentando exponencialmente en muchas partes del mundo. Las mujeres embarazadas en todas las edades gestacionales contarán entre este aumento, y el mayor riesgo sería la interrupción del trabajo de parto y el periodo expulsivo del parto. Si la mujer de parto necesita una cesárea de emergencia o si el plan es lograr un parto vaginal, ella y el equipo que la apoya se enfrentan a muchos desafíos únicos. El artículo presenta la mejor evidencia disponible para abordar muchos de estos desafíos, desde hacer el diagnóstico en casos sintomáticos, hasta el debate entre las pruebas de ácido nucleico y las imágenes de tórax, hasta el manejo de la paciente enferma en trabajo de parto. Existe evidencia razonablemente buena de que la transmisión vertical es poco probable, y se deben hacer esfuerzos para prevenir la infección del neonato. Dado el conocimiento limitado sobre este nuevo coronavirus, que tiene similitudes y diferencias con el SARS y el MERS, las estrategias proporcionadas aquí son una guía general basada en la evidencia disponible actual y que pueden ir cambiando a medida que continuemos aprendiendo más sobre el efecto de COVID-19 en la mujer embarazada.